

# Rindviehhaltung und Wölfe – wie weiter?

austauschen  
verstehen  
weiterkommen




Daniel Mettler  
Herdenschutztagung  
4. Nov. 2021



ENTWICKLUNG DER LANDWIRTSCHAFT UND DES LÄNDLICHEN RAUMS  
DÉVELOPPEMENT DE L'AGRICULTURE ET DE L'ESPACE RURAL  
SVILUPPO DELL'AGRICOLTURA E DELLE AREE RURALI  
DEVELOPING AGRICULTURE AND RURAL AREAS

# Bisherige Erfahrungen und Situationen

Anteil Nutztierarten an den wolfsverursachten Schäden



Anteil der Nutztierarten an den wolfsverursachten Schäden (Anz. getötete/ verletzte/ vermisste Tiere) über die Jahre (2006 bis 2019)

© DBBW Dokumentations- und Beratungsstelle des Bundes zum Thema Wolf

# Rindviehrisse CH und Nachbarländer


- Entschädigte Risse in der Schweiz: 2005 – 2020: ca. 20 Fälle, Diagnose oft nicht eindeutig
- **2021: über 20 Risse und verletzte Tiere**
- Anteil Rindviehrisse in Frankreich 2019: 1,5 % der Nutztierrisse
- (ca. 10'000/150)
- Statistik in Deutschland 2018-20: 4-5 % der Nutztierrisse, Hauptanteil Brandenburg
- Rindviehrisse Trentino 2019 : Regionale Unterschiede und Spezialisierung 23% Rindviehrisse



# Strategie des Kälberschutzes 2021


- Abkalbestrategie Kanton Graubünden
- JSV-Revision – Schadensquote Rinder
- Was kann empfohlen werden zur Prävention?
- Was sind die Anforderungen für Abschüsse?
- Kommunikation Kantone – BAFU – AGRIDEA
- Umgang mit Unterschiede Kleinvieh – Grossvieh

# Schutz der Kälber durch die Mütter




Skizze 1\_Mutterschutz

# Schutz von Mutter und Kalb durch Zaun



Skizze 1\_Schutz durch Zaun


# Risikoanalyse - saisonal – räumlich - betrieblich



Tiergattung	Mutterkuh	Jungvieh	Kalb > 2 Wochen	Kalb < 2 Wochen
Herdenführung	grosse Gruppen	grössere Gruppen ohne Muttertieren	kleine Gruppen mit Muttertieren	vereinzelt
Weidegebiet	kleine eingezäunte Weide	übersichtliche Weide	weitläufige Weide	nächtlicher Weidegang

Betriebseigene Risikoeinschätzung im Streifgebiet Wolfsrudel.

# Risikoanalyse - saisonal – räumlich - betrieblich



Tiergattung	Mutterkuh	Jungvieh	Kalb > 2 Wochen	Kalb < 2 Wochen
Herdenführung	grosse Gruppen	grössere Gruppen ohne Muttertieren	kleine Gruppen mit Muttertieren	vereinzelt
Weidegebiet	kleine eingezäunte Weide	übersichtliche Weide	weitläufige Weide	nächtlicher Weidegang

Betriebseigene Risikoeinschätzung im Streifgebiet Wolfsrudel.



# 2021 – Von den Kälber zu den Rindern

- Risse Kanton Waadt und Graubünden
- Kälberweiden ohne Mütter
- Verletzte Tiere älter als 6 Monate
- Verhaltensveränderung der Herden



# Perspektiven für die Zukunft

- Welche Schutzmassnahmen im Alp/Talgebiet?
- Empfehlungen für Abkalbungen auf der Weide?
- Welche Fördermassnahmen gelten für Jungtiere?
- Welche Schutzmassnahmen sind zumutbar?
- Wann werden Abschussbewilligungen erteilt?
- Wie gross sind die Schäden und Risiken bei Verhaltensänderungen?
- AG Rindvieh HS (Kantone, MuKu, SBV, BUL, AGRIDEA)

# Danke für Ihre Aufmerksamkeit

Für weitere Auskünfte besuchen Sie unsere Website

[www.agridea.ch](http://www.agridea.ch) oder schicken Sie uns ein E-Mail an [info@agridea.ch](mailto:info@agridea.ch)



[www.herdenschutzschweiz.ch](http://www.herdenschutzschweiz.ch)

[info@herdenschutzschweiz.ch](mailto:info@herdenschutzschweiz.ch)